



उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रपिर्ट

प्रलिस के लयः

[वशिव स्वास्थय संगठन \(WHO\)](#), [उच्च रक्तचाप](#), [भारत उच्च रक्तचाप नयितरण पहल \(India Hypertension Control Initiative- IHCI\)](#)

मेन्स के लयः

उच्च रक्तचाप और सार्वजनिक स्वास्थय पर इसके प्रभाव, सार्वभौमिक स्वास्थय कवरेज

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [संयुक्त राष्ट्र महासभा \(UNGA\)](#) के 78वें सत्र के दौरान [वशिव स्वास्थय संगठन \(WHO\)](#) ने "उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रपिर्ट: द रेस अगेस्ट अ साइलेंट कलिर" शीर्षक से एक रपिर्ट जारी की।

- यह [उच्च रक्तचाप](#) के वशिव्यापी प्रभावों पर WHO की पहली रपिर्ट है, जसि सामान्यतः हाइपरटेंशन कहा जाता है।

रपिर्ट के मुख्य तथ्यः

- एक वैश्विक महामारी:
 - वशिव में तीन में से एक वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित है।
 - वर्ष 1990 और वर्ष 2019 के बीच उच्च रक्तचाप के मामलों की संख्या 650 मिलियन से दोगुनी होकर 1.3 बिलियन हो गई है।
 - उच्च रक्तचाप वशिव में 30-79 आयु वर्ग के लगभग 33% वयस्कों को प्रभावित करता है।
 - उच्च रक्तचाप से पीड़ित प्रत्येक पाँच में से लगभग चार व्यक्तियों को पर्याप्त इलाज नहीं मलता है।
- भारत का उच्च रक्तचाप बोझः
 - अकेले भारत में 30-79 वर्ष की आयु के अनुमानित 188.3 मिलियन वयस्क उच्च रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे हैं।
 - भारत में उच्च रक्तचाप की व्यापकता वैश्विक औसत 31% से थोड़ी कम है।
 - 50% नयितरण दर तक पहुँचने के लयि भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित अतिरिक्त 67 मिलियन व्यक्तियों को प्रभावी उपचार मलि।
 - यदि प्रगतप्रदिश्य हासलि कर लयिा गया, तो वर्ष 2040 तक उच्च रक्तचाप के कारण होने वाली 4.6 मिलियन मौतों को रोका जा सकेगा।
- अपर्याप्त उपचारः
 - उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग 80% व्यक्तियों को पर्याप्त उपचार नहीं मलि पाता है।
 - प्रभावी उच्च रक्तचाप उपचार में वर्ष 2050 तक 76 मिलियन मौतों, 120 मिलियन स्ट्रोक, 79 मिलियन दलि के दौरे और 17 मिलियन दलि की वफिलता के मामलों को रोकने की क्षमता है।
- उपचार कवरेज में असमानताएँः
 - उच्च आय वाले देशों में उच्च रक्तचाप के लयि उपचार कवरेज अधिक अनुकूल कवरेज दर वाले देशों के बीच महत्त्वपूर्ण असमानताओं को दर्शाता है।
 - WHO के तहत अमेरिकी क्षेत्र 60% उपचार कवरेज दर के साथ सबसे आगे है, जबकि अफ्रीकी क्षेत्र 27% के साथ उससे पीछे है।
 - उच्च रक्तचाप से पीड़ित तीन-चौथाई से अधिक वयस्क नमिन और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
- समय पर उपचार की आवश्यकताः
 - अनयितरति उच्च रक्तचाप वाले लगभग 30% व्यक्तियों का रक्तचाप का माप, सीमा से ऊपर है, जसिके लयि तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है।
 - वैश्विक स्तर पर उच्च रक्तचाप की दवा लेने वाले 30-70 वर्ष की आयु के वयस्कों का प्रतशित वर्ष 1990 में 22% से दोगुना

होकर वर्ष 2019 में 42% हो गया है।

◦ इसी अवधि के दौरान प्रभावी उपचार कवरेज चौगुना होकर 21% तक पहुँच गया है।


■ कार्रवाई के लिये WHO का आह्वान:

◦ यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज के हिस्से के रूप में उच्च रक्तचाप की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और प्रभावी प्रबंधन को प्राथमिकता देने का आह्वान करता है।

■ सफ़िरशि:

◦ उन उच्च रक्तचाप नियंत्रण कार्यक्रमों को मज़बूत करने की आवश्यकता है जिनमें कम प्राथमिकता दी जाती है और बहुत कम वित्त प्राप्त होता है।

◦ उच्च रक्तचाप नियंत्रण सुनिश्चित करना [सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज](#) की दशा में हर देश का एक अभिन्न अंग होना चाहिये।



रक्तचाप:

■ परिचय:

◦ उच्च रक्तचाप तब होता है जब रक्त वाहिकाओं में दबाव बहुत अधिक (140/90 mmHg या अधिक) होता है। यह सामान्य है लेकिन अगर उपचार न किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है।

- रक्तचाप को दो संख्याओं के रूप में लिखा जाता है:
 - पहली (सिस्टोलिक) संख्या हृदय के संकुचन या स्पंदन पर रक्त वाहिकाओं में दबाव को दर्शाती है।
 - दूसरी (डायस्टोलिक) संख्या वाहिकाओं में दबाव को दर्शाती है, जब धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है।
- उच्च रक्तचाप को लेकर जागरूकता को बढ़ावा देने और लोगों को इस मुक कति जानलेवा बीमारी को रोकने एवं नयित्ति करने के लिये प्रोत्साहित करने की दशा में प्रत्येक वर्ष 17 मई को वशिव उच्च रक्तचाप दविस मनाया जाता है।
- **जोखमि:**
 - उच्च नमक वाले आहार, शारीरिक गतिविधिकी कमी और अत्यधिक शराब का सेवन उच्च रक्तचाप के सबसे प्रमुख योगदानकर्ता हैं, माना जाता है कि **आनुवंशिकी भी उच्च रक्तचाप में भूमिका नभिताती है।**
- **लक्षण:**
 - **उच्च रक्तचाप से गरसति अधकिंश लोगों में कोई लक्षण महसूस नहीं कया जाता है।** बहुत उच्च रक्तचाप के कारण सरिदरद, धुंधली दृष्टि, सीने में दरद और अन्य लक्षण हो सकते हैं।
- **अनयित्ति उच्च रक्तचाप की जटलिताएँ:**
 - उच्च रक्तचाप के कारण हृदय से संबद्ध गंभीर समस्याएँ, जनिमें सीने में दरद, दलि का दौरा, हृदयाघात और हृदय की अनयिमति धड़कन शामिल हैं, साथ ही मस्तष्कि में रक्त का प्रवाह भी प्रभावति होता है जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
- **उपचार:**
 - **जीवनशैली में बदलाव** जैसे- कम नमक वाला आहार अपनाना, वज़न कम करना, शारीरिक गतिविधिके साथ **औषधियों का सेवन** करना चाहयि और तंबाकू आदिमादक पदार्थों का सेवन त्यागना चाहयि।
- **वभिनिन पहल:**
 - **वैश्वकि:**
 - वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप के प्रसार को 25% तक कम करने का वैश्वकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिये WHO और यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डज़िज़ कंट्रोल एंड प्रविशन ने वर्ष 2016 में **ग्लोबल हार्ट्स इनशिएटिवि** लॉन्च कया।
 - **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3 (SDG 3)** का उद्देश्य सभी के लिये स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना है।
 - **भारत:**
 - **भारत उच्च रक्तचाप नयित्तिरण पहल (IHCI) कार्यक्रम:**
 - IHCI जैसे कार्यक्रमों और प्राथमकि स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर **गैर-संचरणीय रोग जाँच** और **उपचार** की दशा में सरकार के प्रयासों के माध्यम से **भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप या मधुमेह के 75 मिलियन रोगियों को मानक देखभाल पर प्रदान करना है।**