

## कश्मीर में यूरेशियन ओटर

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

यूरेशियन ओटर (सामान्यतः ओटर, जसि स्थानीय तौर पर बुडर के नाम से जाना जाता है) को 25-30 वर्ष बाद कश्मीर में देखा गया है। यह ऐतिहासिक रूप से दाचीगाम, डल झील की सहायक नदियों, रंबियारा धारा और लदिदर नदी (पहलगाम में) में पाया गया है।

### यूरेशियन ओटर (*Lutra lutra*)

- **परिचय:** यह यूरेशिया का मूल निवासी एक अर्द्ध-जलीय मांसाहारी स्तनपायी है।
  - यह नदी पारस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रजाति है क्योंकि इसकी उपस्थिति स्वच्छ जल और स्वस्थ जलीय जैवविविधता का सूचक है।
  - भारत में पाई जाने वाली अन्य प्रजातियों में समूथ-कोटेड ओटर्स (संपूर्ण भारत में) और छोटे पंजे वाले ओटर/ ऊदबलिव (हिमालय और दक्षिणी भारत में) शामिल हैं।
- **वर्गीकरण:** यह [?] वंश, [?] कुल, [?] गण से संबंधित है।
- **आहार:** मुख्य रूप से मछली, क्रस्टेशियन और उभयचरों पर भोजन करता है और कभी-कभी सरीसृप, पक्षी, अंडे, कीड़े और कृमि का सेवन करता है।
- **आवास एवं व्यवहार:**
  - हिमालय, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में पाया जाता है।
  - यह नदियों, झीलों, झरनों और आर्द्रभूमि जैसे स्वच्छ लवणीय जल के पारस्थितिकी तंत्रों को पसंद करता है और तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है।
  - यह मुख्य रूप से रात्रिचर (रात में सक्रिय) होता है, जल स्रोतों के पास बलि (जसि होल्ट्स कहा जाता है) बनाता है और अधिकतर अकेला ही रहता है, हालाँकि कभी-कभी मादाएँ अपने शावकों के साथ देखी जाती हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - [IUCN](#): नकिट संकटग्रस्त
  - [वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972](#): अनुसूची II
  - [CITES](#): परशिष्ट I

और पढ़ें: [सतपुड़ा टाइगर रज़िर्व में यूरेशियन ओटर रेडियो-टैग किया](#)

# Eurasian otter (*Lutra lutra*)

Shy, nocturnal and most widely distributed of 13 otter species worldwide


**Population:**  
57,880 - 361,140

**Lifespan:**  
17 years (captivity);  
5-7 years (wild)

**Weight:**  
7-12 kg

**Length:**  
102 - 138 cm

**Conservation status:**  
*Near Threatened*  
on the IUCN Red List



## GEOGRAPHIC RANGE

In India – confirmed in Himalayas, Central India, Western Ghats, Odisha; also, Europe, Asia, North Africa

## HABITAT

Very diverse habitats from frigid rivers in the Trans-Himalayas, to forested regions of Central India and the Western Ghats and the coastal lagoons of Chilika; both freshwater and brackish water habitats

**SOCIAL SCENE**  
Largely solitary and elusive wherever it occurs

**EAT**  
Primarily fish, crustaceans, amphibians, reptiles, birds

**TERRITORY**  
• Highly territorial  
• Males have larger territories than females  
• Males can have overlapping territories with multiple females



## HOME BASE

Build dens called holts on dry ground — usually riverbanks with vegetation

## COMMUNICATION

- Have a mix of whistles, yelps, and high-pitched calls
- Scent from musk glands present at the base of the tail is an important form of communication
- Can be quite vocal, especially with pups

## THREATS

- Hunting
- Habitat loss (loss of wetlands, fragmentation of rivers by dams, agriculture projects etc.)
- Roads
- Conflict with fish pond owners

• Layer of dense, sleek brown fur  
• Short fur traps a layer of air which helps in insulation in cold water  
• High metabolic rate

Use their thick, muscular tail to propel their streamlined bodies in the water

Sensitive whiskers help detect/locate prey in low-light conditions

Fully webbed feet help in swimming

AKA  
Common otter



PHOTO: GLOBEPIQUETTY IMAGES (BRAIN), RAWPIXEL.COM (ROCK),  
MILK AT ENGLISH WIREPIQUETTY PUBLIC DOMAIN/WIREPIQUETTY COMMONS (HOLT)  
TEXT: NISARG PRAKASH, DESIGN: DIVYA MEHRA

roundglass  
sustain

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sighting-of-eurasian-otter-in-kashmir>