

दक्षणि अफ्रीका द्वारा शेरों का कैप्टवि ब्रीडिंग समाप्त

स्रोत: डाउन टू अरथ

हाल ही में दक्षणि अफ्रीका ने ट्रॉफी शकिार (वशीष जानवरों जैसे-हाथी, शेर, गेंडा, भालू इत्यादिका मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया शकिार) पर चतिआँ के कारण शेरों (पैथेरा लयो) के कैप्टवि ब्रीडिंग को समाप्त करने का निर्णय लिया है और पारंपरिक चीनी चकितिसा पद्धतिमें शेर की हड्डियों का उपयोग वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

शेरों के प्रमुख लक्षण क्या हैं?

- **उप-प्रजाति:** शेर को दो उप-प्रजातियों में वभिजति किया गया है: अफ्रीकी शेर (Panthera leo leo) और एशियाई शेर (Panthera leo persica)।
 - अफ्रीकी शेर अधिकांश अफ्रीकी महाद्वीप में फैले हुए थे, लेकिन अब केवल उप-सहारा अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, जिनमें से 80% पूर्वी या दक्षणी अफ्रीका में पाए जाते हैं।
 - एशियाई शेर भारत के गुजरात में गरि राष्ट्रीय उदयान और वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं।
 - हालाँकि शेरों की दोनों उप-प्रजातियाँ लगभग समान दखिती हैं, फरि भी इनमें कुछ अंतर हैं।
 - अफ्रीकी शेरों की तुलना में नर एशियाई शेरों के अयाल वरिल और छोटे होते हैं।
 - इसके अतिरिक्त, नर और मादा दोनों एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से छोटे होते हैं।




African lion



Asiatic lion

- **आवास:** वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं तथा वर्भनिन प्रकार के आवासों में रहते हैं लेकिनिधास के मैदान, सवाना, घने झाड़ियों और खुले बुड़लैंड को पसंद करते हैं।
- **सामाजिक संरचना:** शेर सबसे बड़ी सामाजिक बलिती प्रजाति हैं, जो प्राइड (prides) नामक समूहों में रहते हैं।
 - एक प्राइड में आमतौर पर कई संबंधित मादाएँ, उनके शावक और कुछ वयस्क नर शामिल होते हैं।
 - शेरनियाँ प्राथमिक शकिरी होती हैं, जबकि प्रमुख शेर प्राइड के क्षेत्र की रक्षा के लिये ज़मिमेदार होते हैं।
- **शकिर और आहार:** शेर शीर्ष शकिरी होते हैं और मुख्य रूप से वाइल्डवीस्ट, ज़ेबरा तथा मृग जैसे बड़े खुरों वाले जानवरों का शकिर करते हैं।
 - वे आमतौर पर शकिर को पकड़ने के लिये अपनी चपलता और अपने समूह के सहयोग से शकिर करते हैं।
 - इसके अतिरिक्त शेर अवसरवादी भक्षक होते हैं और मौका मिलने पर शकिर करने से नहीं हथिकचित्ते, अक्सर अन्य शकिरियों से शकिर चुरा लेते हैं।
- **खतरा:**
 - उन्हें नवीन स्थान ककी हानि और वर्षिंडन से लेकर जलवायु परिवर्तन एवं उपलब्ध शकिर में कमी जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है।
 - उन्हें ट्रॉफी शकिरियों द्वारा भी नशिना बनाया जाता है।
 - ट्रॉफी शकिर का एक रूप है जहाँ प्राथमिक आवश्यकता हेतु जानवरों को उनके शरीर के अंगों, जैसे सींग, दाँत या खाल के लिये मारा जाता है, जिन्हें बाद में ट्रॉफी या समृतचिन्ह के रूप में (और मुख्य रूप से भोजन के रूप में नहीं) रखा जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
 - [IUCN की रेड लिस्ट](#): लुप्तप्राय
 - [CITES](#): प्रशिष्ट।
 - [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधनियम 1972](#): अनुसूची।



Distribution Map Panthera Leo

नोट:

- भारत में, प्रोजेक्ट लॉयन संरक्षण और प्रयावरण-विकास को एकीकृत करके गुजरात में एशियाई शेर के परदृश्य पारस्थितिकी आधारित संरक्षण की प्रक्रिया करता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की 2023 की रपोर्ट के अनुसार, गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क शेरों को राज्य के बहुत वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?/?/?/?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सरिफ भारत में पाए जाते हैं।
- दो-कबूँड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सरिफ भारत में पाया जाता है।
- एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सरिफ भारत में पाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न 2: हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से नमिनलखिति में से कसि स्थल पर स्थानांतरित किया जाने का प्रस्ताव था? (2017)

- कॉर्बेट नेशनल पार्क
- कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य
- मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य

(d) सरस्का राष्ट्रीय उद्यान

उत्तर: (b)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/south-africa-to-end-captive-breeding-of-lions>

