

कम तीव्रता वाली वर्षा में गरिबों से उत्तर भारत में भूजल रचिअरज में आई कमी

चरचा में क्यों ?

देश भर में फैले 5,800 से अधिक भूजल कुओं से 1996 से 2016 के बीच एकतरति कयि गए आँकड़ों के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के शोधकर्त्ताओं ने पाया है कविवर्षा की तीव्रता भूजल रचिअरज से घनषिठता से जुड़ी होती है ।

प्रमुख बडि

- मानसून काल के समय वशिषतः उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत के मामले में कम तीव्रता वाली वर्षा (low-intensity rainfall) भूजल रचिअरज के लयि जमिमेदार होती है, जबकदक्षिण भारत में भूजल रचिअरज हेतु अधिक तीव्रता वाली वर्षा मुख्य भूमिका नभिाती है ।
- इन नषिकर्षों को 'जयोफजिकल रसिअरज लेटर्स' जनरल में प्रकाशति कयि गया ।
- यदिवर्षा की मात्रा प्रतदिनि 1-35 ममी के बीच है, तो वर्षा को कम तीव्रता वाली वर्षा के रूप में वर्गीकृत कयि जाता है । जबकप्रतदिनि 35 ममी से अधिक वर्षा होती है, तो इसे उच्च तीव्रता वाली वर्षा के रूप में वर्गीकृत कयि जाता है ।
- आईआईटी गांधीनगर की एक टीम ने पाया कअध्ययन कयि गए तीन क्षेत्नों में वर्षा की तीव्रता के संदर्भ में भूजल स्तर एक्वीफायर की प्रकृति से अंतरसंबंधति हैं ।
- उत्तर भारत में वशिष रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्न के एक्वीफायर जलीय मृदा द्वारा वशिषीकृत होते हैं, जबकदक्षिण भारत में कठोर चट्टान वाले एक्वीफायर पाए जाते हैं ।
- जलीय मृदा वाले एक्वीफायर वर्षण के दौरान भूजल रचिअरज में अधिक समय लेते हैं ।
- कम तीव्रता वाली वर्षा जल को प्रसरण और एक्वीफायर के रचिअरज हेतु अधिक समय प्रदान करती है । इस कारण ये उत्तर भारत के भूजल के लयि अनुकूल होती है ।
- इसके वषिरीत, दक्षिण भारत में हार्ड-रॉक और बेसाल्टिक एक्वीफायर देखे जाते हैं । यहाँ, कम तीव्रता वाली वर्षा की तुलना में उच्च तीव्रता वाली वर्षा भूजल रचिअरज में अधिक योगदान देती है ।
- शोधकर्त्ताओं ने 1996 से 2016 के बीच के भूजल स्तर संबंधी आँकड़ों का उपयोग करते हुए प्रत्येक कुए के प्रत्येक वर्ष के भूजल रचिअरज का अनुमान लगाया ।
- भूजल रचिअरज का अनुमान वाटर टेबल फ्लक्चुएशन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए मई और नवंबर के महीनों के मध्य के भूजल स्तर अंतराल के मापन द्वारा लगाया गया ।
- ध्यातव्य है क1951 और 2016 के बीच गंगा के मैदानी क्षेत्न, महाराष्ट्र, तमलिनाडु के कुछ भागों और पश्चिमी घाटों के क्षेत्न में वर्षा की वार्षिक मात्रा में कमी आई है ।
- लेकिन वशिष रूप से पूरे भारत में कम तीव्रता वाली वर्षा की मात्रा में कमी आई है । खासकर मध्य भारत, गंगा के मैदानी क्षेत्न में इसकी मात्रा में बड़ी गरिबट देखने को मली है और कुछ हद तक उत्तर-पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में भी इसकी मात्रा में गरिबट दर्ज की गई है ।
- इसके वषिरीत, उत्तर-पश्चिमी भारत (गुजरात और राजस्थान), दक्षिण भारत, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में उच्च तीव्रता वाली वर्षा में वृद्धि हुई है । केरल में दोनों प्रकार की वर्षा में गरिबट दर्ज की गई है ।
- अध्ययन काल के दौरान दक्षिण भारत में उच्च तीव्रता वाली वर्षा में वृद्धि के कारण भूजल रचिअरज में वृद्धि हुई है ।
- शोधकर्त्ताओं का कहना है कउनके नषिकर्षों के अनुसार, उत्तर भारत में वर्षा की भूजल स्तर में बढोतरी संबंधी प्रकृति में बदलाव आ चुका है, जबकगहन कृषि की मांगों को पूरा करने हेतु सचिाई के लयि भूजल की नकिासी में वृद्धि हो रही है, जसिने एक असंतुलन की स्थतिपैदा कर दी है ।

आगे की राह

शोधकर्त्ताओं का मानना है कउत्तर भारत को भूजल टेबल में गरिबट की जाँच करने के लयि अतरिक्ति प्रयास करने की आवश्यकता है । इसके लयि कृत्रमि भूजल रचिअरज का सहारा लयि जा सकता है । साथ ही सचिाई हेतु भूजल की नकिासी में भी कमी लानी होगी और इन दोनों उपायों को एक साथ अपनाना होगा ।

