रॉक ग्लेशियर

प्रलिमि्स के लयि:

झेलम, रॉक ग्लेशियर, ग्लेशयिल झील में बाढ़, भूस्खलन, थर्मोकार्स्ट, बटगाइका क्रेटर

मेन्स के लयि:

रॉक ग्लेशयिरों के संभावति परणिाम, हमिनद गतशिीलता को प्रभावति करने वाले कारक, हमिनदों के पीछे हटने का प्रभाव

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

एक हालयिा अध्ययन ने **कश्मीर हमिालय के झेलम बेसनि में 100 से अधकि सक्रयि पर्माफ्रॉस्ट संरचनाओं की उपस्थतिि पर प्रकाश** डाला है। ये संरचनाएँ, जन्हिें रॉक ग्लेशयिर के रूप में जाना जाता है, क्षेत्र के जल वज्ञिान पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और **जलवायु के गर्म** होने पर संभावति जोखमि उत्पन्न करती हैं।

रॉक ग्लेशियर क्या है?

- **परचिय:**
  - रॉक ग्लेशयिर एक प्रकार की भू-आकृतिहैं जसिमें **चट्टान के टुकड़े और बर्फ का मश्रिण** होता है।
  - रॉक ग्लेशयिर आमतौर पर **पहाड़ी क्षेत्रों** में बनते हैं जहाँ **पर्माफ्रॉस्ट, रॉक मलबे** और **बर्फ का संयोजन** होता है।
    - **पर्माफ्रॉस्ट** एक स्थायी रूप से जमी हुई परत है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे मौजूद होती है। य**ह मट्टिी, बजरी और रेत से बना होता है जो आमतौर पर बर्फ से एक साथ जुड़ा रहता** है।
    - एक सामान्य परदृिश्य में **पहले से मौजूद ग्लेशयिर** जो आगे बढ़ने पर मलबा और चट्टानें इकट्ठा करता है, एक सामान्य घटना है। यदग्लिेशयिर पघिलता है, तो मलबे से ढकी बर्फ अंततः चट्टानी ग्लेशयिर में परविर्तति हो सकती है।
  - ये चट्टानी ग्लेशयिर तीव्र ढलान वाले अत्यधकि ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
  - **नग्न आँखों से चट्टानी ग्लेशयिर मुख्यतः सतह की तरह दखिते हैं** , उनकी सही पहचान के लयि भू-आकृतविज्ञिान संबंधी दृष्टकिोण की आवश्यकता होती है।
- **वर्गीकरण:**
  - उनमें बर्फ और गतिहै या नहीं, इसके आधार पर उन्हें**सक्रयि या अवशेष** के रूप में जाना जाता है। अवशेष **चट्टानी ग्लेशयिर अधकि स्थरि और नष्क्रयि होते हैं**, जबकसिक्रयि चट्टानी **ग्लेशयिर अधकि गतशिील व खतरनाक** होते हैं।
- **महत्त्व:**
  - रॉक ग्लेशयिर **पर्माफ्रॉस्ट पर्वत** के महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं, जो स्थायी रूप से स्थरि भूमहिै जसिके अंतर्गत कई ऊँचाई वाले क्षेत्र आते हैं।
  - रॉक ग्लेशयिर के अपने जमे हुए कोर में **वृहद मात्रा में जल संग्रहति** होता है जो **जल की कमी और हमिनदों के खसिकने** की स्थतिमिें एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है।

क्षेत्र पर सक्रयि रॉक ग्लेशयिरों के संभावति प्रभाव क्या हैं?

- **ग्लेशयिर लेक आउटबर्स्ट फ्लड/हमिनद झील वच्छिेद बाढ़ (Glacial lake outburst floods- GLOF):**
  - These are sudden and **catastrophic floods that occur when a glacial lake bursts** its natural or artificial dam, releasing large volumes of water and debris downstream. ये आकस्मकि और वनिाशकारी बाढ़ जैसी स्थतियिाँ उत्पन्न होती हैं, जो तब होती हैं जब एक हमिनद झील का प्राकृतकि या कृत्रमि बाँध टूट जाता है, जसिसे भारी मात्रा में जल तथा मलबा नचिले क्षेत्र की ओर वनिाशकारी रूप से प्रवाहति हो जाता है।

        - **सक्रिय रॉक ग्लेशियर** ढालों या हिमनद झीलों के बाँधों को अस्थिर करके **GLOF के खतरे को बढ़ाते** हैं।
    - हिमनद झीलों, जैसे **चरिसर** और **ब्रैमसर झील के निकटवर्ती रॉक ग्लेशियर**, **GLOF** के **खतरे को बढ़ाते** हैं।
- **भू-स्खलन:**
    - भूस्खलन (Landslide) एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें शैल, मिट्टी और मलबे के एक भाग का नीचे की ओर खिसकना या संचलन करना शामिल होता है।
    - भूस्खलन प्राकृतिक और मानव-निर्मित, दोनों ही ढलानों पर हो सकते हैं तथा वे प्रायः भारी वर्षा, **भूकंप**, ज्वालामुखीय गतिविधियों, मानव गतिविधियों (जैसे– निर्माण या खनन) और भूजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं।
        - सक्रिय रॉक ग्लेशियर **ढलान की स्थिरता को कमज़ोर करके** या पिघलकर जल मुक्त करने से **भू-स्खलन का कारण बनते** हैं जो फिसलती हुई सतह के स्खलन में योगदान देता है।
    - पिघलती पर्माफ्रॉस्ट इन क्षेत्रों को अस्थिर बनाती है, जिससे आस-पास की बस्तियों और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है।
        - उदाहरण के लिये **क्यूबेक में नुनावि**क क्षेत्र कई वर्ष पूर्व **मुख्यतः पर्माफ्रॉस्ट मैदान पर बसाया गया** था। पिछले दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण **निचली स्तरों में बर्फ पिघलनी शुरू हो गई,** जिससे **भू-स्खलन की आवृत्ति और अन्य खतरे बढ़ गए।**
- **थर्मोकार्स्ट:**
    - यह एक प्रकार का भू-भाग है जो **बर्फ से समृद्ध पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से बनने वाली दलदली खोखली और छोटी-छोटी चट्टानों (कटक) की अनियमित सतहों** का रूप है।
        - सक्रिय रॉक ग्लेशियरों से तालाबों अथवा झीलों जैसी थर्मोकार्स्ट संरचनाओं का निर्माण हो सकता है जो **संबद्ध क्षेत्र के जल-विज्ञान (Hydrology), पारिस्थितिकी तथा कार्बन चक्र** को प्रभावित कर सकते हैं।
    - जम्मू-कश्मीर के **कुलगाम शहर के समीप जल निकायों की उपस्थिति भूमिगत पर्माफ्रॉस्ट के अस्तित्व का सुझाव देती है जो 'थर्मोकार्स्ट झीलों' के समान है** जिनके परिणामस्वरूप भविष्य में जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
        - पृथ्वी की सतह के नीचे हिम के पिघलने से सतह के ढहने का खतरा अधिक होता है। जिसके परिणामस्वरूप सिंकहोल्स, टेकरी (Hummocks), गुफाओं तथा सुरंगों की उत्पत्ति हो सकती है जो जोखिमपूर्ण हो सकता है।
        - **बटागाइका क्रेटर थर्मोकार्स्ट का एक उदाहरण है**, यह **विश्व का सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर** है **जो सखा गणराज्य, रूस में स्थित है।**

कश्मीर हिमालय की झेलम बेसिन:

- झेलम द्रोणी/बेसिन का अपवाह **ऊपरी झेलम नदी** से होता है जिसका उद्गम **कश्मीर घाटी में पीर पंजाल** शृंखला के तल पर स्थित **अनंतनाग के वेरिनाग** में एक झरने से होता है, यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले **श्रीनगर एवं वुलर झील** से होकर गुजरती है।
- **सिंधु नदी** की एक सहायक नदी के रूप में झेलम नदी भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी नदी प्रणाली में योगदान देती है।
    - यह नदी जम्मू-कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवाहित होती है जहाँ यह **चिनाब नदी** में मिल जाती है।
- पंजाब की पाँच नदियों में झेलम सबसे बड़ी तथा सबसे पश्चिमी नदी है।
- इसकी प्राथमिक सहायक नदी **किशनगंगा (नीलम) नदी** है। **कुन्हार नदी** इसकी एक अन्य महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है जो कंघान घाटी में कोहाला पुल के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर एवं पाकिस्तान को जोड़ती है।

हिमानी स्थलाकृतियाँ GLACIAL LANDFORMS

"क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलछट एवं जल से निर्मित क्षेत्र, जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी होती है, को हिमनद/हिमानी कहते हैं।"

अपरदित स्थलरूप



सर्क (Cirque/Cwm)

- छोटे हिमनद और विशिष्ट रूप से कटोरे के आकार क
- हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं

गिरिश्रृंग और सिरेटेड कटक (Horns and Serrated Ridges)

- सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से निर्मित होते हैं
- उन क्षेत्रों में विद्यमान जहाँ कई हिमनद विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होते हैं

हिमनद घाटी/ गर्त (Glacial Valleys/ Troughs)

- गर्त की भाँति होती हैं तथा आकार में अंग्रेज़ी के अक्षर U जैसी, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं।
- गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, उन्हें फियोर्ड कहते हैं।

हिम-विदर/हिम दरार (Bergschrund)

- एक हिमनद/दरार या दरारों की श्रृंखला जो प्रायः किसी पर्वतीय हिमनद के शीर्ष के निकट पाई जाती है

लटकती घाटी (Hanging Valley)

- तब बनती है जब हिमनद की बर्फ किसी मुख्य या ट्रंक घाटी को गहराई से आच्छादित कर लेती है, जिससे सहायक नदी घाटियाँ मुख्य घाटी के तल से बहुत ऊपर लटकती हुई दृश्यमान होती हैं।

शृंग पुच्छ (Crag and Tail)

- शृंग: खड़ी ढलान वाली कठोर चट्टान का समूह।
- पुच्छ: हिमनदों के मलबे के निक्षेपण या हिमनद के पीछे हटने के कारण निर्मित।

निक्षेपित स्थलरूप



हिमोढ़ (Moraines)

- पार्श्विक हिमोढ़ (Lateral Moraines): हिमनदों के किनारों पर निर्मित
- तलस्थ हिमोढ़ (Ground Moraines): अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप
- मध्यस्थ हिमोढ़ (Medial Moraines): वहाँ निर्मित होते हैं जहाँ दो सहायक हिमोढ़ एक साथ मिलते हैं

एस्कर (Eskers)

- हिमनदों के भीतर या नीचे बहने वाली धाराओं द्वारा निर्मित रेत और बजरी के घुमावदार कटक

हिमानी धौत मैदान (Outwash Plains)

- हिमनदों के पिघलने पर उनके साथ बहकर आने वाली रेत व बजरी का निक्षेप

ड्रमलिन (Drumlins)

- तलछट की पहाड़ियाँ जिन्हें हिमनद प्रवाह द्वारा सुगठित किया गया है।
- लंबाई 1 किमी. तक और ऊँचाई 30 मीटर या उससे अधिक
- आमतौर पर अंडो की टोकरी के समान दिखने वाली (basket of eggs') स्थलाकृति की टोकरी के रूप में वर्णित किया जाता है

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

आगे की राह

- यह अध्ययन हिमालय क्षेत्र में **जलवायु परिवर्तन** के प्रभावों को समझने तथा उन्हें कम करने में पर्माफ्रॉस्ट अनुसंधान की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।
    - **सक्रिय रॉक ग्लेशियरों की जलीय क्षमता** पर आगे के अध्ययन के लिये संसाधन आवंटित करना, जल की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में स्थायी उपयोग के लिये संग्रहीत जल का दोहन करने के तरीकों की खोज करना।
- संभावित आपदाओं के बारे में समुदायों और अधिकारियों को सचेत करने के लिये पहचाने गए सक्रिय रॉक ग्लेशियरों वाले क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विकसित एवं कार्यान्वित करें।
- ग्लेशियरों से रॉक ग्लेशियरों में संक्रमण से उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों पर विचार करते हुए, पर्माफ्रॉस्ट अध्ययन के निष्कर्षों को **क्षेत्रीय और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाओं** में एकीकृत करें।
- पर्माफ्रॉस्ट क्षरण से जुड़े जोखिमों के बारे में **स्थानीय समुदायों,** योजनाकारों और नीति निर्माताओं के बीच **जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता** है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न1. सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन उनमें से एक में मिलती हैं, जो अंततः सीधे सिंधु में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? (2021)

(a) चिनाब
(b) झेलम
(c) रावी
(d) सतलज

उत्तर: (d)

प्रश्न. पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठे पानी में बर्फ का आवरण और हिमनद मौजूद हैं। शेष मीठे पानी में से सबसे अधिक अनुपात किस रूप में मौजूद है? (2013)

(a) वातावरण में नमी और बादलों के रूप में पाया जाता है।
(b) मीठे पानी की झीलों और नदियों में पाया जाता है।
(c) भूजल के रूप में मौजूद है।
(d) मिट्टी की नमी के रूप में मौजूद है।

उत्तर: C

जल स्रोत	जल की मात्रा (घन किलोमीटर)	मीठे जल का प्रतिशत	कुल जल का प्रतिशत
महासागर, समुद्र और खाड़ियाँ	1,338,000,000	-	96.54
बर्फ छत्रक, ग्लेशियर और स्थायी बर्फ	24,064,000	68.7	1.74
भूमिगत जल	23,400,000	30.3	1.69
मिट्टी की नमी	16,500	0.05	0.001
भूमिगत बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट	300,000	0.86	0.022
झील	176,400	-	0.013
वायुमंडल	12,900	0.04	0.001
नदियाँ	2,120	0.006	0.0002
जैविक जल	1,120	0.003	0.0001

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

?????:

प्रश्न1. क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rock-glaciers